



Dónde encontrarnos

Hospital Oncológico y de Terapias Avanzadas



¿Cómo llegar?

Dirección: Calle de Múiquez 7, 28009 Madrid, España.

Metro: Línea 6 (O'Donnell) y Línea 9 (Sainz de Baranda).

Autobús: 15, 28, 30, 56 143, 156, 202, 215, N6, N8 N27.



Información de contacto

ONCOLOGÍA:	636314586
Horario:	LUNES a VIERNES laborables 8:00 – 15:00 horas
HEMATOLOGÍA:	675957853
Horario:	LUNES a VIERNES laborables 8:00 – 15:00 horas
HOSPITAL DE DÍA:	91 5868448
Horario:	LUNES a VIERNES 15:00 – 21:00 horas



¿Cuándo acudir a Urgencias?

- Si presenta fiebre superior a 38°C
- Si presenta un dolor intenso
- Si la lesión empeora: aumento del enrojecimiento, hinchazón o ampollas
- Si presenta signos de infección (calor, enrojecimiento o pus)

Iconos de: [Flaticon.com](https://www.flaticon.com/)

Extravasaciones: cómo manejarlas en su domicilio

¿Qué es una extravasación?

Una extravasación es la fuga no intencionada de un fármaco durante su administración, desde la vena hacia los tejidos que la rodean.

Esto podría irritar la piel provocando hinchazón o ardor en la zona afectada. En algunos casos podría causar un daño de mayor gravedad como úlceras o ampollas.

Algunas causas de las extravasaciones son la fragilidad de las venas o el potencial irritativo de los fármacos que se utilizan en el tratamiento.

Signos y síntomas

- Hinchazón.
- Sensibilidad.
- Sensación de tirantez.
- Entumecimiento, hormigueo.
- Dolor ardiente y punzante.
- Puede aparecer enrojecimiento seguido de ampollas, rotura del tejido y ulceración.

(Pie de página a insertar por la Comisión de Valoración de la Información Sanitaria)

MEDIDAS GENERALES

La lesión debe protegerse y vigilarse de cerca durante unos días o semanas:

- Compruebe el área alrededor de la lesión todos los días para ver si hay algún cambio (por ejemplo, cambio de color, ampollas o descamación).
- No frote ni rasque el área.
- No use ropa ajustada sobre el área.
- Proteja la zona de la luz solar.
- Levante el brazo lesionado sobre una almohada si esto le alivia.
- Ejercite/mueva suavemente el brazo lesionado.
- No use cremas o lociones en el área sin consultar primero.

OTRAS RECOMENDACIONES

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Las siguientes medidas pretenden reducir la hinchazón y la irritación. También reducen la posibilidad de sufrir más daños.

Le indicaremos cuál de las siguientes medidas debe utilizar (*marcar con una X*).

	FRÍO LOCAL
	<p>¿Cómo utilizar el tratamiento?</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tome una bolsa de hielo y asegúrese de que el exterior esté seco. Puede usar una bolsa de plástico para cubrirlo, si fuera necesario.2. Coloque un paño fino y limpio (por ejemplo, un paño de cocina) sobre el área lesionada o alrededor de la bolsa de hielo.3. Coloque la bolsa de hielo en el área lesionada y déjela durante 15 a 20 minutos. Retire el paño antes si le produce dolor o molestias. <p>¿Cuándo utilizar este tratamiento?</p> <p>Repita el tratamiento cada 6 horas (durante las horas diurnas) durante los primeros 2-3 días.</p>

	CALOR SECO MODERADO
	<p>¿Cómo utilizar el tratamiento?</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tome un paño y caliéntelo hasta que este tibio. Asegúrese de que esté seco, utilizando una bolsa de plástico para cubrirlo, si es necesario.2. Coloque un paño fino y limpio (por ejemplo, un paño de cocina) sobre el área lesionada.3. Coloque el paño tibio (sobre el paño anterior) en el área lesionada y déjelo durante 15 a 20 minutos. Retire el paño antes si le produce dolor o molestias. <p>¿Cuándo utilizar este tratamiento?</p> <p>Repita el tratamiento cada 6 horas (durante las horas diurnas) durante los primeros 2-3 días.</p>