



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

RIOCIGUAT (ADEMPAS®)

1, 1,5 y 2,5 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

RIOCIGUAT (ADEMPAS®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Riociguat es un estimulador de la guanilato-ciclasa que actúa ensanchando las arterias pulmonares, facilitando al corazón el bombeo de sangre a los pulmones. Está indicado para el tratamiento de la **hipertensión pulmonar tromboembólica crónica** y la **hipertensión arterial pulmonar**.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomarse **tres veces al día**, con un intervalo aproximado entre tomas de 8h, **con o sin alimentos**, aunque se recomienda hacerlo siempre igual. En caso de dificultad para tragar, los comprimidos pueden triturarse y mezclarse con agua o con un alimento blando.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis olvidada lo antes posible a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **dolor de cabeza, mareo, indigestión, hinchazón de las extremidades, diarrea y náuseas o vómitos**.

Consulte con su médico si estos síntomas se vuelven severos e interfieren con sus actividades diarias. En caso de presentar **tos con sangre**, contacte con su médico inmediatamente.

Informe a su médico o farmacéutico de cualquier efecto adverso que experimente.

Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que podrían alterar el efecto de riociguat.
- **Comuníquese a su médico o farmacéutico si empieza o deja de fumar** durante el tratamiento con este medicamento.
- Este medicamento contiene **lactosa**.
- Se aconseja el uso de **métodos anticonceptivos** en mujeres en edad fértil. No deben quedar embarazadas hasta un mes después de finalizado el tratamiento con Riociguat. Debe **evitarse la lactancia** materna durante el tratamiento con riociguat.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org