



Antimicrobianos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ABACAVIR/LAMIVUDINA

600/300 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# ABACAVIR/LAMIVUDINA

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Abacavir/lamivudina es una combinación de dos fármacos antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Puede tomar abacavir/lamivudina **CON o SIN alimentos**. Si tiene dificultad para tragar, puede deshacer el comprimido en un poco de agua, zumo de naranja o uva y tomarlo inmediatamente.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **molestias gastrointestinales** (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal), **mareos, dolor de cabeza, cansancio, malestar y reacciones de hipersensibilidad**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



## ¡Atención!

**REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A ABACAVIR.** Usted tiene más probabilidad de desarrollar esta reacción alérgica grave si tiene un gen llamado **HLA-B\*5701**. Antes de iniciar el tratamiento, le deberían haber realizado la prueba de detección de este gen. Esta reacción suele ocurrir en las primeras 6 semanas de tratamiento y empeora al continuarlo. Consulte a su médico **INMEDIATAMENTE** si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos.

Abacavir/lamivudina® contiene un colorante llamado **amarillo anaranjado S (E110)**, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.



## Recuerde...

- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)