



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ACETILCISTEÍNA 10% colirio 4 ml

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ACETILCISTEÍNA 10% colirio



¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza como tratamiento en la queratoconjuntivitis seca filamentosa



Composición


Composición por 4 mL

Acetilcisteína 100 mg/ml amp (Hidonac).....400 mg
Artific colirio.....2 ml



¿Cómo administrarlo?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- **Cierre los ojos** durante 1-2 minutos **tras la administración**. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



¿Cómo conservarlo?

En nevera.

No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase. Deseche el colirio a los 7 días de su apertura.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

En pacientes sensibles a acetilcisteína, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad con la aplicación tópica tales como irritación, ardor, lagrimeo o sensación de cuerpo extraño. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si

Tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular.

No use acetilcisteína colirio sin hablar primero con su médico si está usted embarazada. No se conocen los riesgos que podría tener para el bebé.

Evite su uso durante la lactancia materna.



Recuerde...

- La acetilcisteína tiene un **olor a azufre muy peculiar** que es normal.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915868587 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org