



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

AMBRISENTÁN

5 y 10 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

AMBRISENTÁN

¿Qué es y para qué se utiliza?

Ambrisentán se emplea en el tratamiento de la **hipertensión pulmonar** (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón). Pertenece a la familia de **Antagonistas del Receptor de Endotelina (AREs)**.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Puede tomarlo **con o sin alimentos**. Los comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis olvidada lo antes posible, Si la siguiente dosis se encuentra muy próxima (menos de 12h) tome **la dosis siguiente a la hora habitual**. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **dolor de cabeza, retención de líquidos, anemia, congestión del tracto respiratorio, fatiga, molestias digestivas (náuseas, estreñimiento, diarrea)**.

Puede aparecer un **empeoramiento de la dificultad de respirar** al inicio de tratamiento.

Consulte con su médico si estos síntomas se vuelven severos e interfieren con sus actividades diarias. Informe a su médico o farmacéutico de cualquier efecto adverso que experimente.

Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que podrían alterar el efecto de ambrisentán.
- Este medicamento contiene **lactosa**. Este medicamento puede contener soja.
- Si se quedara embarazada durante el tratamiento, comuníquese a su médico lo antes posible. Debe evitarse la lactancia materna durante el tratamiento con ambrisentán.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org