



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ATAZANAVIR (REYATAZ®)

200 y 300 mg cápsulas



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ATAZANAVIR (REYATAZ®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Atazanavir es un inhibidor de la proteasa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Habitualmente se toma con ritonavir (Norvir®). En ese caso, ambos fármacos deben tomarse juntos.

Tome las cápsulas **CON ALIMENTOS** para garantizar que se absorba bien.

Las cápsulas deben tomarse enteras. No debe abrir las cápsulas.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos), cefalea, cansancio, ictericia (coloración amarilla en el blanco del ojo y piel) y erupción cutánea**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

Este medicamento contiene **lactosa**. Informe a su médico o farmacéutico si padece una intolerancia a ciertos azúcares.

Comuníquese cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de atazanavir. Es especialmente importante que mencione el uso de **medicamentos para reducir el colesterol en sangre, rifampicina, sildenafil u otros medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil, anticonceptivos, inmunosupresores, antifúngicos, antiepilépticos, anticoagulantes y medicamentos para el tratamiento de la alergia o asma**.

La toma concomitante con hierba de San Juan están contraindicada.

Las **mujeres en edad fértil** deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico.

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org