



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ETANERCEPT (BENEPALI®)

50 mg pluma precargada



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# ETANERCEPT (BENEPALI®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Etanercept es un fármaco inhibidor del TNF- $\alpha$  que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades crónicas autoinmunes como artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial no radiológica, artritis psoriásica y psoriasis.



## ¿Cómo se administra?

Adminístresela lo antes posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico o farmacéutico cuándo administrarla.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístresela lo antes posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico o farmacéutico cuándo administrarla.



## ¿Cómo conservarlo?

En la nevera (NUNCA en el congelador) y en su caja original para protegerlo de la luz. Una vez utilizada, deposítela en el contenedor amarillo que le hemos entregado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer hematoma, enrojecimiento, dolor, hinchazón, picor y/o sangrado.
- Pueden aparecer infecciones, incluyendo infecciones del tracto respiratorio alto, bronquitis, cistitis e infección cutánea y cefalea.
- Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- No se debe utilizar etanercept durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva hasta 3 semanas después de la última dosis. Si es madre lactante, valore con su médico el beneficio-riesgo de la lactancia materna antes de utilizar este medicamento.



## ¡Atención! comuníquese a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Tiene programada alguna operación quirúrgica.
- Tiene alergia a la sacarosa.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.



## Recuerde...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital utilizando una nevera portátil.
- Si tiene algún problema con la medicación y no puede ponérsela, NO LA TIRE, devuélvanosla a la Farmacia del Hospital y cuéntenos qué problema ha tenido.
- Mantenga este medicamento y el contenedor amarillo fuera de la vista y del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
914269271-914265094 [farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org)