



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA
(BIKTARVY®)

50/200/25 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA (BIKTARVY®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Biktarvy® es una combinación de fármacos antirretrovirales para el VIH (Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida) que está indicado en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Biktarvy® puede tomarse **CON o SIN alimentos**. No debe masticar ni triturar los comprimidos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 6 horas para la siguiente dosis. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, diarrea, náuseas, trastornos del sueño, mareo y cansancio**. Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

Biktarvy® no debe administrarse conjuntamente con **antiácidos** que contengan aluminio / magnesio (empleados para tratar la indigestión o el ardor de estómago). En caso de necesidad, tome Biktarvy® al menos 2 horas antes de los antiácidos, o 2 horas después con alimentos.

Si necesita tomar suplementos de hierro, Biktarvy® debe administrarse al menos 2 horas antes de la administración de los suplementos, o tomar los dos medicamentos juntos con alimentos.

La toma de **rifampicina e Hierba de San Juan** están contraindicadas. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de **antiepilépticos** como la oxcarbamazepina, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital y, en caso de padecer una enfermedad renal, de **antidiabéticos** como la metformina.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org