



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ENCORAFENIB (BRAFTOVI®)

(cápsulas de 75 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ENCORAFENIB (BRAFTOVI®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Encorafenib es un fármaco antitumoral inhibidor de RAF-quinasa. En combinación con cetuximab, se utiliza para el **tratamiento del cáncer de colon** con mutación en BRAF.



¿Cómo tomarlo?

Los cápsulas deben tragarse **enteras con un vaso de agua, con o sin alimentos**. Lávese las manos antes y después de cada toma.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Braftovi® 75 mg	Desayuno	Comida	Cena	Con o sin alimentos



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis. Si vomita, no debe tomar una dosis adicional. Espere hasta la siguiente dosis programada.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **fatiga, cefalea, estreñimiento o diarrea, náuseas y vómitos, pérdida o debilitamiento del cabello, insomnio o disminución del apetito**. Puede aparecer también: **problemas de visión, dolores musculares o hipertensión**. Evite la exposición directa al sol.
- Vigile su tensión arterial**, ya que encorafenib la podría incrementar. En caso de detectar **alteraciones o empeoramiento en la visión**, contacte con su equipo asistencial.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.



Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales, ya **que encorafenib puede interaccionar con numerosos medicamentos**. Especialmente si toma: antifúngicos, antibióticos, antiretrovirales, anticonceptivos hormonales, antihipertensivos, diuréticos, hipocolesterolemiantes, antiepilépticos, hierba de san Juan (hipérico) y zumo de pomelo.
- No reciba ninguna vacuna sin el conocimiento previo de su médico.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- El Servicio de Farmacia dispensará las cápsulas de encorafenib. Si le sobra medicación, devuélvala al hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org