



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ENCORAFENIB (BRAFTOVI®)

(cápsulas de 75 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ENCORAFENIB (BRAFTOVI®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Encorafenib es un fármaco antitumoral inhibidor de RAF-quinasa. Combinado con binimetinib, está indicado en el tratamiento de melanoma con mutación BRAF y cáncer de colon con mutación BRAF.



¿Cómo tomarlo?

Los cápsulas deben **tragarse enteras con un vaso de agua, con o sin alimentos**. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis.

Si vomita, no debe tomar una dosis adicional. Espere hasta la siguiente dosis programada.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Y manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **fatiga, cefalea, estreñimiento o diarrea, náuseas y vómitos, pérdida o debilitamiento del cabello**, insomnio o disminución del apetito. Puede aparecer también: **problemas de visión**, dolores musculares o hipertensión.
- **Vigile su tensión arterial**, ya que encorafenib la podría incrementar.
- Puede presentar **reacciones cutáneas** (picores, piel seca, dermatitis): manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- **Evite la exposición directa al sol**: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazos y piernas; utilice protección solar alta y protector labial.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- En caso de detectar alteraciones o empeoramiento en la visión, contacte con su oncólogo, farmacéutico o enfermero.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una **mujer fértil** o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta) y productos naturales que esté tomando, ya que **encorafenib puede interactuar con numerosos medicamentos**. Especialmente si toma: antifúngicos, antibióticos, antiretrovirales, anticonceptivos hormonales, antihipertensivos, diuréticos, hipocolesterolemiantes, antiepilépticos, hierba de san Juan (hipérico) y zumo de pomelo.
- **Informe a su médico si tiene que interrumpir la medicación**.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org