



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ENCORAFENIB (BRAFTOVI®)

(cápsulas de 75 mg)

BINIMETINIB (MEKTOVI®)

(comprimidos de 15 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ENCORAFENIB (BRAFTOVI®) y BINIMETINIB(MEKTOVI®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Encorafenib y Binimetinib son dos fármacos antitumorales, inhibidores de RAF-quinasa y de MEK, respectivamente. En combinación, se usan en el **tratamiento de melanoma** con mutación BRAF y **cáncer de colon** con mutación BRAF.



¿Cómo tomarlo?

Los cápsulas deben tragarse **enteras con un vaso de agua, con o sin alimentos**. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas (Braftovi) o 6 horas (Mektovi) espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis.

Si vomita, no debe tomar una dosis adicional, espere hasta la siguiente.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad y manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **fatiga, cefalea, estreñimiento o diarrea, náuseas y vómitos, pérdida o debilitamiento del cabello**, insomnio o disminución del apetito. Puede aparecer también: **problemas de visión**, dolores musculares o hipertensión.
- **Vigile su tensión arterial**, ya que estos fármacos la podrían incrementar.
- Puede presentar **reacciones cutáneas** (picores, piel seca, dermatitis): manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- **Evite la exposición directa al sol**: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazos y piernas; utilice protección solar alta y protector labial.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, **debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las **personas en edad fértil, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos.
- En caso de detectar alteraciones o empeoramiento en la visión, contacte con su oncólogo, farmacéutico o enfermero.



Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales, ya que **encorafenib/binimetinib pueden interaccionar con numerosos medicamentos**.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- El Servicio de Farmacia dispensará las cápsulas de Encorafenib. Si le sobra medicación, devuélvala al hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org