



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **BEVACIZUMAB 5 mg/ml colirio 4 ml** **Fórmula magistral**



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# BEVACIZUMAB 5 mg/ml colirio

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para el tratamiento de la neovascularización en la córnea.



## Composición

### Composición por 4 mL


Bevacizumab	20 mg
Suero fisiológico 0,9%	4 mL

Contiene Benzalconio cloruro



## ¿Cómo se administra?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- Cierre los ojos durante 1-2 minutos tras la administración y evite frotarse los ojos en este intervalo. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo en la nevera.

Una vez abierto el colirio, escriba la fecha y deseche el envase a los 7 días. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Deseche el colirio en el contenedor de residuos de su domicilio.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Este colirio por su contenido en cloruro de benzalconio, podría ser un poco irritante, pero en general es bien tolerado.



## ¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc). Se considera seguro su uso durante el embarazo y la lactancia.



## Recuerde...

- Si usted usa lentes de contacto, el cloruro de benzalconio puede alterar el color de las mismas. Retírelas antes de aplicar el colirio y espere 15 minutos antes de volver a colocárselas.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915868587 [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)