



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CABOZANTINIB (CABOMETYX®)

(comprimidos de 20, 40 y 60 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

CABOZANTINIB (CABOMETYX®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Cabozantinib es un medicamento utilizado en el tratamiento del **carcinoma de células renales (un tipo de cáncer de riñón)** avanzado en adultos que ya han recibido tratamiento previo.



¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse **enteros con un vaso de agua y sin alimentos, 1h antes o 2h después de comer**, siempre en el mismo horario. Evitar tomar pomelo o zumo de pomelo. No se deben partir, masticar, ni machacar.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, cansancio, pérdida de apetito, dolor de cabeza, reducción de peso, hipertensión, reacciones cutáneas**
- Puede presentar reacciones **cutáneas (especialmente en manos y pies)**: utilice ropa cómoda, calcetines de algodón, cremas hidratantes, champús neutros, evite el agua muy caliente y utilice protección solar.
- Vigile su **tensión arterial**, ya que cabozantinib la podría incrementar.
- Acuda a Urgencias ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar).



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- Comunique a su médico o farmacéutico si le van a **operar (incluida cirugía dental)**, ya que previamente deberá suspender el tratamiento.
- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Cabozantinib puede interactuar con ellos.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la Farmacia del Hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org