



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VANDETANIB (CAPRELSA®)

(comprimidos de 100 y 300 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

VANDETANIB (CAPRELSA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Vandetanib es un inhibidor de tirosin quinasas que está indicado en el **tratamiento del cáncer medular de tiroides**.



¿Cómo tomarlo?

Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar, machacar o partir los comprimidos. Puede tomarlos **CON o SIN alimentos, siempre en el mismo horario**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, debilidad, cansancio, espasmos musculares, calambres, cambios en el ritmo cardiaco, elevación de enzimas hepáticas**. Puede aparecer también: **cefalea, hipotiroidismo, pérdida de peso, insomnio, náuseas y vómitos, dolor abdominal**.
- Vigile su **tensión arterial**, ya que vandetanib la podría incrementar.
- Puede presentar **reacciones cutáneas** (erupción, acné, sequedad, prurito): manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- **Evite la exposición directa al sol**: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazos y piernas; utilice protección solar alta y protector labial.
- Si tiene fiebre > 38º, dificultad para respirar, síntomas de infección o de reacción alérgica grave acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- No reciba ninguna vacuna sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos



Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales, ya que **vandetanib puede interactuar con numerosos medicamentos** (cisaprida, eritromicina, ivabradina, metadona, sulpirida, digoxina, metformina, acenocumarol, warfarina, itraconazol, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, hierba de San Juan y zumo de pomelo).
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**.
- La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión de la enfermedad.
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- **Devuelva la medicación** no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org