



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

MICOFENOLATO DE MOFETILO (CELLCEPT®)

250 mg cápsulas

500 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

MICOFENOLATO DE MOFETILO (CELLCEPT®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Micofenolato de mofetilo es un fármaco que actúa modulando el sistema inmune y se utiliza en patologías en las que el sistema inmune está alterado.

¿Cómo tomarlo?

Se administra por **vía oral**. Debe tomar las cápsulas o los comprimidos enteros, sin abrir, partir ni triturar. Puede tomarlo con o sin alimentos pero siempre a la misma hora.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente toma, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

Conserve la medicación a la temperatura ambiente y en su blíster original (envase de plástico metalizado) para protegerlo de la humedad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Pueden aparecer infecciones víricas o bacterianas, disminución del número de glóbulos rojos y/o blancos en la sangre, dolor de cabeza, hipertensión, tos, dificultad para respirar, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, náuseas y vómitos.
- Limite la cantidad de luz solar y luz ultravioleta mediante el uso de ropa apropiada que le proteja y que también cubra su cabeza, cuello, brazos y piernas y utilice crema para el sol con factor de protección alto.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas **vacunas**. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a urgencias si presenta **síntomas de infección** (fiebre, dolor de garganta, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.

¡Atención! comunique a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Está contraindicado el uso de micofenolato de mofetilo durante el embarazo y durante la lactancia materna. Si es una mujer en edad fértil, utilice anticoncepción efectiva durante el tratamiento y hasta al menos 6 semanas después de la última dosis. Si es un hombre sexualmente activo utilice anticoncepción efectiva durante el tratamiento y hasta al menos 90 días después de la última dosis.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.

Recuerde...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital.
- Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org