



Antimicrobianos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ISAVUCONAZOL (CRESEMBA®)

100 mg cápsulas



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# ISAVUCONAZOL (CRESEMBA®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Isavuconazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados antifúngicos. Actúa eliminando o impidiendo el crecimiento de los hongos que producen infecciones.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Puede tomar isavuconazol **CON** o **SIN** alimentos. Las cápsulas deben ingerirse enteras y sin fraccionar.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela con una comida tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: elevación de transaminasas, alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, disnea, dolor abdominal y diarrea), dolor de cabeza, disminución de los niveles de potasio en sangre y erupción cutánea. También puede aparecer disminución del apetito, alucinaciones, somnolencia, cansancio, dificultad respiratoria e insuficiencia renal.

**Debe informar inmediatamente a su médico en caso de que aparezcan los siguientes síntomas:** erupción cutánea, hinchazón de los labios, boca, lengua o garganta con dificultad para respirar, pues pueden ser signos de una reacción alérgica (hipersensibilidad), o formación de ampollas grave de la piel, boca, ojos o genitales. Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.



## ¡Atención!

Informe a su médico si tiene un problema con el ritmo cardiaco llamado 'síndrome de QT corto'.

Isavuconazol **no debe tomarse conjuntamente con algunos medicamentos como inhibidores potentes del CYP3A4/5 como ketoconazol** (puede aumentar significativamente las concentraciones plasmáticas de isavuconazol), **ni con inductores del CYP3A4/5 como rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenobarbital, efavirenz, fenitoína, efavirenz, nafcilina y etravirina y hierba de San Juan** (estos medicamentos pueden disminuir significativamente las concentraciones plasmáticas de isavuconazol).

**Si está embarazada o en periodo de lactancia, comuníquesele inmediatamente a su médico.** Las mujeres embarazadas no deben tomar isavuconazol, salvo que se lo indique específicamente el médico. Isavuconazol no se debe utilizar durante la lactancia.



## Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que isavuconazol puede alterar el efecto de otros fármacos.
- **Conducción y uso de máquinas:** se debe evitar conducir o utilizar maquinaria si experimentan síntomas de estado de confusión, somnolencia, síncope y/o mareos.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)