



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CAPECITABINA (CAPECITABINA®)

(comprimidos de 150, 300 y 500 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

CAPECITABINA (CAPECITABINA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Capecitabina es un fármaco antitumoral precursor de 5-fluorouracilo que inhibe el ARN y la síntesis proteica indicado para el tratamiento de cáncer colorrectal, gástrico y mama en combinación o en monoterapia.



¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse **enteros con un vaso de agua** por la mañana y por la noche, **justo después del desayuno y la cena**. Lávese las manos antes y después de cada toma.

DOSIS		DÍAS
Desayuno	Cena	Desde el ___/___/___ hasta el ___/___/___ (___ días)
___ comp. de 150 mg	___ comp. de 150 mg	
___ comp. de 300 mg	___ comp. de 300 mg	
___ comp. de 500 mg	___ comp. de 500 mg	



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas, espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis. Si vomita, repita la dosis únicamente si ha pasado menos de 1 h desde la toma.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, vómitos, náuseas, síndrome mano-pie, fatiga, llagas en la boca o garganta (mucositis), dolor de pecho, mayor riesgo de hemorragias, mayor susceptibilidad a tener infecciones**. Evite la exposición directa al sol.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria



¡Atención!

- Comuníquese a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- Si es **diabético** controle más estrechamente sus niveles de glucosa.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar **medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.



Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. **Capecitabina puede interactuar con numerosos medicamentos**.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**.
- El Servicio de Farmacia dispensará los comprimidos de capecitabina. Si le sobra medicación, devuélvala al hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
679050691 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org