



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CEFAZOLINA 50 mg/ml colirio 5 ml

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

CEFAZOLINA 50 mg/ml colirio



¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza como antibiótico frente a microorganismos que causan infecciones en la superficie del ojo.



Composición


Composición por 5mL

Cefazolina	250 mg
Suero fisiológico 0,9%	4,25 mL
Agua para inyección	0,75 mL



¿Cómo se administra?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- **Cierre los ojos** durante 1-2 minutos **tras la administración**. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración.

Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo en nevera y protegido de la luz.

Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 5 días.

No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas.

Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Si tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular.

Se considera seguro su uso durante el embarazo.

Durante la lactancia habría que sopesar el beneficio/riesgo.



Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio lave la zona con agua abundante.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915868587 farmacia.hgugm@salud.madrid.org