



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CICLOSPORINA 1% colirio 6 mL

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

CICLOSPORINA 1 % colirio



¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para reducir la respuesta inmunitaria en trasplante de córnea, queratopatía crónica autoinmune, queratoconjuntivitis vernal y otras patologías.



Composición


Composición por 6 mL

Ciclosporina A	60 mg
Excipientes (TCM)	csp 6 mL



¿Cómo administrarlo?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- Cierre los ojos durante 1-2 minutos tras la administración. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Lávese nuevamente las manos tras la administración. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración.

Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Evite la exposición a altas temperaturas. También se puede conservar en nevera.

Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 30 días.

No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas. Una vez pasados 5-10 minutos desde la administración puede usar lágrima artificial para mejorar tolerancia. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento.

Su médico valorará el balance beneficio/riesgo en caso de embarazo y/o lactancia materna.

A las dosis terapéuticas de Ciclosporina 1 % colirio, es poco probable que haya cantidad suficiente de medicamento en la leche materna.



Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio lave la zona con agua abundante.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915868587 farmacia.hgugm@salud.madrid.org