



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CINACALCET

30, 60 y 90 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

CINACALCET

¿Qué es y para qué se utiliza?

Cinacalcet actúa controlando los niveles de la hormona paratiroidea, calcio y fósforo y se utiliza para tratar alteraciones de unos órganos llamados glándulas paratiroides.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se recomienda tomar cinacalcet **con la comida**. Los comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis de cinacalcet, debe **tomar la dosis siguiente a la hora habitual**. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **náuseas y vómitos, mareos, sensación de entumecimiento u hormigueo, disminución del apetito, dolor muscular, debilidad, erupción cutánea, reacciones alérgicas, dolor de cabeza, convulsiones, presión arterial baja, dificultad para respirar, tos, malestar de estómago, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, dolor de espalda o espasmos musculares, infección de las vías respiratorias bajas, bajos niveles de calcio en sangre.**

Consulte con su médico si durante el tratamiento presentara: entumecimiento u hormigueo alrededor de la boca, dolores musculares o calambres y convulsiones. Estos pueden ser síntomas de que sus niveles de calcio son demasiado bajos (hipocalcemia).

Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que cinacalcet puede alterar el efecto de otros fármacos.
- Comuníquese a su médico o farmacéutico si **es intolerante a la lactosa**.
- Los pacientes con problemas hereditarios raros de **intolerancia a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa** no deben tomar este medicamento.
- Comuníquese a su médico si está embarazada o en proceso de lactancia.
- **Conducción y uso de máquinas:** se aconseja no conducir y no usar máquinas si aparecen mareos o convulsiones.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org