



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CLORHEXIDINA 0,05 % colirio

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# CLORHEXIDINA 0,05% colirio



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para el tratamiento de la queratitis producida por Acanthamoeba y como antiséptico en cirugía oftalmológica.



## Composición


### Composición por 10 mL

Digluconato de clorhexidina 20%	0,025 mL
Ácido acético 3·H <sub>2</sub> O	180 mg
Ácido bórico	19 mg
Agua para inyección	csp 10 mL



## ¿Cómo se administra?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- Cierre los ojos durante 1-2 minutos tras la administración. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 15 minutos entre administraciones.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días. No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas.

Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



## ¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc). Se considera seguro su uso durante el embarazo y la lactancia.



## Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915868587 [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)