



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA (DESCOVY®)
200/10 mg y 200/25 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA (DESCOVY®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descovy® es una combinación de dos fármacos antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH (emtricitabina y tenofovir alafenamida) que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Descovy® puede tomarse **CON o SIN alimentos**. Si vomitara en el plazo de 1 hora después de tomar Descovy®, debe tomar otro comprimido. No debe masticar ni triturar el comprimido.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de **6 horas** para la siguiente toma. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **náuseas, diarrea, mareos**, problemas para dormir, fatiga y dolor en las articulaciones. Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

- No se recomienda la administración concomitante de Descovy® con ciertos antiepilépticos (p. ej., carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital y fenitoína), antimicobacterianos (p. ej., rifampicina, rifabutina, rifapentina) y hierba de San Juan.
- Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org