



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

FIDAXOMICINA (DIFICLIR®)

200 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

FIDAXOMICINA (DIFICLIR®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Fidaxomicina es un antibiótico que se utiliza para el tratamiento de la infección causada por *Clostridiodes difficile*. Esta bacteria puede habitar en el intestino y producir diarrea, que puede ser desde leve a severa. Otros síntomas pueden incluir fiebre, pérdida de apetito, náuseas o inflamación del intestino.

¿Cómo tomarlo?

Siga las instrucciones que le ha dado su médico o farmacéutico. Tome los comprimidos enteros, con o sin alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30º C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son **náuseas, vómitos y estreñimiento**. También pueden aparecer, con menor frecuencia: disminución del apetito, mareo, dolor de cabeza, sequedad de boca, gusto alterado (disgeusia), sensación de estar lleno, gases (flatulencia), erupción y picazón (prurito).

Raramente puede ocurrir una reacción alérgica grave, incluyendo dificultad para respirar (disnea), inflamación de la cara o la garganta (angioedema), erupción grave o picazón (prurito) grave. Si dichas reacciones ocurren, debe interrumpir el tratamiento y contactar con su médico o farmacéutico.

¿Qué precauciones debe seguir en el domicilio para evitar contagiar a otras personas?

La bacteria puede propagarse de persona a persona, o bien a través de contacto con superficies contaminadas. Por ello, es fundamental que la persona infectada, sus cuidadores y su familia **se laven frecuentemente las manos con agua y jabón. Debe hacerse siempre que se use el cuarto de baño y antes de comer**. Para ello, siga estas recomendaciones:

0. Mójese las manos con agua.
1. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos.
2. Frótese las palmas de las manos entre sí.
3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.
4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados.
5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con palma de la mano derecha y viceversa.
7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
8. Enjuáguese las manos con agua.
9. Séquelas con una toalla de un solo uso.
10. Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Siempre que sea posible, la persona con diarrea por *C. difficile* debe tener su habitación y utilizar un cuarto de baño distinto.

También debe ser exhaustiva la limpieza. Es aconsejable limpiar las superficies del baño y la cocina con lejía diluida, así como otras superficies que se tocan habitualmente: interruptores de luz, teléfonos, mandos a distancia, tiradores del baño, asiento del inodoro, pomos de puertas, etcétera.

Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural. Algunos medicamentos como la **ciclosporina, ketoconazol, eritromicina, claritromicina, verapamilo, dronedarona y amiodarona** pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de fidaxomicina.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia, informe a su médico o farmacéutico antes de tomar fidaxomicina.
- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.



EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hugum@salud.madrid.org