







SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DILTIAZEM

Suspensión 10 mg/ml, frasco 50 ml



Tu farmacéutico de hospital, cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento



DILTIAZEM 10 mg/mL suspensión oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico se lo ha pautado para controlar su tensión arterial



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Intente tomarlo siempre a la misma hora, preferiblemente antes de las comidas. En dosis única administrarlo por la mañana. Si toma antiácidos separar 2 horas su administración Agitar bien la suspensión antes de administrarlo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

Conservar en nevera y protegido de la luz. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer: hinchazón en los miembros inferiores, enrojecimiento de cara y cuello, mareos al levantarse, nauseas, dolor de estomago, estreñimiento, dolor de cabeza, cansancio. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico. Informe a su médico inmediatamente si sufre reacciones alérgicas cutáneas, miopía transitoria, trastornos auditivos.
- Avise a su médico inmediatamente si sufre, dificultades respiratorias, reacción alérgica, fiebre, latido cardíaco irregular, vértigos, inflamación de pies y tobillos.



¿Cómo se elabora?

Composición por 100 ml:

Diltiazem.....1 g

Jarabe simple......c.s.p 100 ml

Excipientes: este medicamento contiene sacarosa 888 mg/mLy metilparaben sódico.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón 915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org