



Antimicrobianos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

RILPIVIRINA (EDURANT®)

25 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# RILPIVIRINA (EDURANT®)

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Rilpivirina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.

## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Tome rilpivirina **CON ALIMENTOS** para garantizar que se absorba bien. Tenga en cuenta que una bebida nutricional (por ejemplo, rica en proteínas) no reemplaza a una comida.

No masticar ni triturar el comprimido.

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela con una comida tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

## ¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **trastornos del sueño, dolor de cabeza, mareo, náuseas, pérdida de apetito, cansancio y erupción cutánea**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

## ¡Atención!

Los comprimidos contienen lactosa. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a la lactosa u otros azúcares.

Rilpivirina **no debe tomarse conjuntamente con algunos medicamentos para tratar las úlceras de estómago/intestino o aliviar el ardor de estómago como son los inhibidores de la bomba de protones** (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol). Sí puede tomarse con otros fármacos como la ranitidina o famotidina si se toma 12 horas antes o 4 horas después de rilpivirina, y con antiácidos (p. ej., hidróxido de aluminio o magnesio, carbonato cálcico) si éstos se toman 2 horas antes o 4 horas después de rilpivirina.

**Si está embarazada, comuníquese inmediatamente a su médico.** Las mujeres embarazadas no deben tomar rilpivirina, salvo que se lo indique específicamente el médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

## Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)