



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SOFOSBUVIR 400mg/VELPATASVIR 100 mg
(EPCLUSA®) comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

SOFOSBUVIR/VELPATASVIR (EPCLUSA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Epclusa® contiene dos principios activos, sofosbuvir y velpatasvir, que inhiben el crecimiento y la reproducción del virus de la hepatitis C (VHC). Está indicado en el tratamiento de la infección crónica por el VHC.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Tome Epclusa® siempre a la misma hora. Puede tomarlo **CON O SIN ALIMENTOS**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre muy próxima (menos de 6 horas) que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **sensación de cansancio**, **dolor de cabeza** o **náuseas**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.



¡Atención!

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los medicamentos antivirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914265137 | farmacia.hugm@salud.madrid.org