



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VISMODEGIB (ERIVEDGE®)
(cápsulas duras de 150 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

VISMODEGIB (ERIVEDGE®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Erivedge es un medicamento para el tratamiento del cáncer y contiene el principio activo vismodegib. Se utiliza para tratar a adultos con un tipo de **cáncer de piel** conocido como **carcinoma de células basales avanzado**.



¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse enteras con **un vaso de agua** una vez al día con o sin alimentos. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, no debe tomar la dosis olvidada, sino que debe reanudar con la siguiente dosis programada.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en el frasco original perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **espasmos musculares, alopecia, disgeusia, pérdida de peso, fatiga, náuseas, diarrea y pérdida de la menstruación en mujeres en edad fértil**.
- Puede provocar cambios en los análisis de sangre, incluyendo valores aumentados de las pruebas de hígado o valores aumentados de creatina fosfoquinasa (una proteína principalmente del músculo).
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- No debe donar sangre mientras estén tomando Erivedge ni durante los 24 meses posteriores a la administración de la última dosis.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, **debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos



Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Vismodegib puede interactuar con numerosos medicamentos.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org