



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

PIRFENIDONA (ESBRIET®)  
(267 y 801 mg comprimidos)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# PIRFENIDONA (ESBRIET®)

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Pirfenidona tiene propiedades antifibróticas y antiinflamatorias y se utiliza para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) leve a moderada en adultos.

## ¿Cómo tomarlo?

Aumente gradualmente la dosis diaria hasta alcanzar la recomendada por su médico (ver tabla en la parte inferior del documento).

Tome la medicación **con agua y alimentos**. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

**Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.**

## ¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente, pero **nunca a una temperatura superior a 30º C**. Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes están: **alteraciones gastrointestinales, reacción por fotosensibilidad, mareo, cansancio, elevación de transaminasas, pérdida de apetito y peso.**

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

## Recuerde ...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales.**
- Informe inmediatamente a su médico o farmacéutico en caso de quedar embarazada.
- Recuerde utilizar diariamente crema de **protección solar y evitar la exposición al sol.**
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.**

DÍA DE TRATAMIENTO	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Día 1 al 7	267 mg	267 mg	267 mg	Con las comidas
Día 8 al 14	534 mg	534 mg	534 mg	Con las comidas
A partir del día 15	801 mg	801 mg	801 mg	Con las comidas

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org