



Antimicrobianos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ENTECAVIR 0,5 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ENTECAVIR

¿Qué es y para qué se utiliza?

Entecavir es un fármaco inhibidor de la polimerasa que está indicado en la profilaxis y tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB).

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Tome entecavir siempre a la misma hora. Puede tomarlo **CON O SIN ALIMENTOS**.

Se recomienda que no manipule el comprimido, y se lave sus manos y las superficies que hayan estado en contacto con el medicamento.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, insomnio, fatiga, mareos, somnolencia, náuseas, vómitos, diarrea y molestias gastrointestinales**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

Los comprimidos contienen **lactosa**. Informe a su médico o farmacéutico si padece intolerancia a la lactosa u otros azúcares.

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los medicamentos antivirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914265137 | farmacia.hugm@salud.madrid.org