



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### FUROSEMIDA

Solución 2 mg/ml jeringa



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



## FUROSEMIDA 2 mg/mL solución oral



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico le ha prescrito este medicamento para controlar su **tensión arterial** y para el control de la acumulación de **líquidos en el cuerpo**.



### ¿Cómo tomarlo?

- Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tómelo **en ayunas** (1h antes o 2h después de la última ingesta) e intente tomarlo siempre a la misma hora. En dosis única administrarlo por la mañana.
- Agitar bien la suspensión antes de administrarlo.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.



### ¿Cómo conservarlo?

Conservar en **temperatura ambiente** y protegido de la luz. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Avise a su médico inmediatamente si sufre mareos, debilidad, calambres, dolor de cabeza y sed intensos, latidos irregulares, reacciones alérgicas, vómitos y diarrea. Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.



### ¿Cómo se elabora?

#### Composición por 100 ml:

Furosemida .....	200 mg
Sodio fosfato dibásico 12-hidrato.....	1,5 g
Nipagin.....	80 mg
Nipasol .....	20 mg
Agua para laboratorio RFE.....	c.s.p 100 ml

Excipientes: este medicamento contiene nipagin y nipasol.



### Recuerde...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar** a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón  
915290405 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)