



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E
E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA
(GENVOYA®)

150/150/200/10 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA (GENVOYA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Genvoya® es una combinación de fármacos antirretrovirales para el VIH (Elvitegravir/cobicistat + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida) que está indicado en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico o farmacéutico. Tome los comprimidos **CON ALIMENTOS**.

Si Ud. no puede tragar el comprimido entero, puede partirlo por la mitad y tomar las dos mitades seguidas. No masticar ni triturar el comprimido.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 6 horas para la siguiente dosis. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes (>1%) se encuentran: trastornos gastrointestinales (náuseas, diarrea, dolor abdominal, flatulencia), cefalea, mareo, cansancio, alteraciones del sueño y erupción cutánea.

Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

Los comprimidos contienen **lactosa**. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a la lactosa u otros azúcares.

La administración de Genvoya® junto con medicamentos antiepilépticos (carbamazepina, fenobarbital y fenitoína), rifampicina, antiarrítmicos (amiodarona, quinidina), cisaprida, medicamentos para reducir el colesterol (simvastatina, lovastatina) y otros medicamentos como ergotamina, midazolam y neurolépticos (pimozida) está contraindicada. También es importante que mencione el uso concomitante de medicamentos para la disfunción eréctil (sildenafil) y productos de herbolario. La toma de hierba de San Juan está contraindicada.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo efectivo, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de Genvoya®.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org