



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

AFATINIB (GIOTRIF®)

(comprimidos de 20, 30 y 40 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

AFATINIB (GIOTRIF®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Afatinib es una terapia dirigida que se utiliza en el tratamiento del **cáncer de pulmón no microcítico** localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos **no se deben masticar ni machacar**. Si tiene problemas para tragarlos, contacte con su farmacéutico del hospital. Deben tomarse en **ayunas (al menos 1 hora antes o 3 horas después de comer)**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que falten menos de 8 horas para la siguiente toma. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Lávese las manos tras su manipulación. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, acné, úlceras bucales, picor, piel seca, pérdida de apetito, dermatitis, exantema (erupción cutánea), sangrado por la nariz, infección en las uñas**.
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.



¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



Recuerde...

- Comunique con su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta) o producto natural que esté tomando, ya que afatinib puede presentar interacciones.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org