

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TOPOTECÁN (HYCAMTIN®)

(cápsulas duras de 0,25mg y 1mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

TOPOTECÁN (HYCAMTIN®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Topotecán es un fármaco inhibidor de la topoisomerasa que se utiliza en el **tratamiento de cáncer de pulmón microcítico** y otros tipos de tumores.



¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse **enteras con un vaso de agua, con o sin alimentos**. Lávese las manos antes y después de cada toma.

DOSIS	DÍAS
Desayuno	Desde el ___/___/___ hasta el ___/___/___ (___ días)
___ cáps. de 0,25 mg	
___ cáps. de 1 mg	



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis para compensar la toma olvidada.



¿Cómo conservarlo?

Se debe conservar refrigerado (2-8°C) hasta el momento de tomarlo. Siempre que sea posible, guárdelo en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, llagas en la boca (mucositis), mayor susceptibilidad a infecciones, cansancio, dolor de cabeza**. Debido al descenso de sus plaquetas, existe un mayor riesgo de aparición de **moratones y sangrado fácil**. Evite el uso de cuchillas, use cepillos de dientes suaves, tenga cuidado con los golpes y al manejar objetos cortantes.
- Si tiene **signos de anemia como cansancio o debilidad inusual o signos de alteración hepática como coloración amarillenta de ojos y piel**; acuda a su médico de atención primaria.
- Si tiene **signos de infección** (tos, fiebre >38º, dificultad al orinar), signos de sangrado (heces negras, sangre en orina o hematomas), reacción alérgica grave, dolor abdominal agudo, convulsiones, cefalea intensa, o diarrea que no cesa acuda a Urgencias.



¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es alérgico al topotecán. Si es **diabético** controle más estrechamente sus niveles de glucosa.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar **medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.



Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales**.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
679050691 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org