



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### HIDROCLOROTIAZIDA

Suspensión 2 mg/ml fr 50 ml



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



# HIDROCLOROTIAZIDA 2 mg/mL suspensión oral



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico le ha prescrito este medicamento para controlar su tensión arterial y para el control de la acumulación de líquidos en el cuerpo.



## ¿Cómo tomarlo?

Tómelo con comidas o con un vaso de leche. Intente tomarlo siempre a la misma hora. En dosis única administrarlo por la mañana.

Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.



## ¿Cómo conservarlo?

Consérvelo en nevera. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza, vértigos, mareos, somnolencia. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.
- Avise a su médico inmediatamente si sufre alteraciones hematológicas, hipotensión, reacciones alérgicas cutáneas, debilidad muscular, espasmos, visión amarilla.
- Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.



## ¿Cómo se elabora?

### Composición por 200 ml:

Hidroclorotiazida.....400 mg

Glicerol.....40 ml

Metilcelulosa 1% gel.....100 ml

Ácido cítrico monohidrato....0,3 g

Agua para laboratorio.....60 ml

Excipientes: este medicamento contiene glicerol y benzoato sódico.



## Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón  
915290405 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)