



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

PALBOCICLIB (IBRANCE®)

(comprimidos de 75, 100 y 125 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

PALBOCICLIB (IBRANCE®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Ibrance es un medicamento para el tratamiento del cáncer y contiene el principio activo palbociclib. Es un fármaco indicado para el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado.



¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse **enteras con alimentos**, preferiblemente **en una comida**, a la **misma hora**, para asegurar una exposición uniforme a palbociclib. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis o vomita, tome la siguiente dosis como estaba previsto. No tome una dosis doble para compensar las cápsulas olvidadas.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **susceptibilidad a tener infecciones, sensación de cansancio, disminución del apetito, inflamación de la boca y labios (estomatitis), náuseas, vómitos, diarrea, erupción o pérdida del cabello.**
- Puede presentar **alteraciones hematológicas** (reducción del número de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas). Contacte con su médico inmediatamente si manifiesta fiebre, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar, sangrado o tendencia a los cardenales.
- Otros efectos adversos frecuentes pueden ser: fiebre con reducción del recuento de glóbulos blancos (neutropenia febril), visión borrosa, aumento del lagrimeo, ojo seco, alteraciones hepáticas en los análisis de sangre, alteración de los sabores (disgeusia), sangrado de nariz, piel seca, debilidad o fiebre.



¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las **personas en edad fértil, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Palbociclib puede interactuar con numerosos medicamentos.**
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- El Servicio de Farmacia dispensará los comprimidos de palbociclib. Si le sobra medicación, devuélvala al hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org