



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

IKERVIS® (CICLOSPORINA) 1 mg/ml

Colirio monodosis



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

## IKERVIS (CICLOSPORINA) 1 mg/ml colirio



### ¿Qué es y para qué se utiliza?


Es un fármaco **inmunosupresor** que se emplea para tratar a pacientes con **queratitis grave** (inflamación de la córnea). Se utiliza en aquellos pacientes con **xeroftalmia (ojo seco)** que no ha mejorado pese al tratamiento con lágrimas artificiales.



### ¿Cómo administrarlo?

Debe esperar al menos 15 minutos si ha usado previamente otro colirio.

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- Parpadee varias veces y a continuación **cierre los ojos** durante 1-2 minutos **tras la administración**. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. **Tire el envase abierto** y lávese nuevamente las manos tras la administración. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 10 minutos entre administraciones.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



### ¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo a **temperatura ambiente** en un lugar fresco y seco. Evite la exposición a altas temperaturas. También se puede conservar en nevera.

Después de abrir la bolsa de aluminio que contiene los envases monodosis, debe mantener el resto de envases en su interior para protegerlos de la luz y evitar la evaporación. Desechar los envases abiertos después de su uso.



### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Puede notar dolor con la aplicación, irritación, lagrimeo, enrojecimiento de párpado y conjuntiva, hinchazón del párpado y visión borrosa. Una vez pasados 5-10 minutos desde la administración puede usar lágrima artificial para mejorar tolerancia. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



### ¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico:

Si tiene alergia a algún medicamento, si está en tratamiento con algún medicamento que contenga esteroides, o tratamiento para el glaucoma y en caso de infección ocular previa por virus del herpes que pueda haber dañado la córnea.

**No debe usarse** este fármaco durante el **embarazo**. Es probable que el fármaco se secrete en pequeñas cantidades en la leche materna. En caso de lactancia, consulte al médico antes de utilizar este medicamento.



### Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio **lave la zona con agua** abundante.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915868587 [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)