



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

POMALIDOMIDA (IMNOVID®)

(comprimidos de 3 y 4 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

POMALIDOMIDA (IMNOVID®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Pomalidomida es un medicamento utilizado en el tratamiento del **mieloma múltiple** (un cáncer de la médula ósea). Se administra a pacientes adultos que han recibido al menos dos tratamientos previos.



¿Cómo tomarlo?

Tomar a la misma hora cada día. Este medicamento debe **tomarse entero**, preferiblemente con agua. Las cápsulas **no deben abrirse, romperse ni masticarse**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **hematológicos** (anemia, disminución de los glóbulos blancos, disminución de las plaquetas) **fatiga**, **fiebre**, **hinchazón**, **neumonía** y **hormigueo e insensibilidad en manos y pies**.
- Acuda a Urgencias ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar).



¡Atención!

- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar **medidas anticonceptivas dobles**, desde 4 semanas antes de iniciar el tratamiento hasta 4 semanas tras su finalización. Pomalidomida podría causar graves malformaciones en el feto. Debe realizar un test de embarazo antes de iniciar el tratamiento y luego periódicamente.



Recuerde...

- Comunique a su **médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, **ya que pomalidomida puede interactuar con ellos**.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la **medicación no utilizada** a la Farmacia del Hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org