



Antineoplásicos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E  
E

SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

GEFITINIB (IRESSA®)  
(comprimidos de 250 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# GEFITINIB (IRESSA®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Gefitinib es un inhibidor tirosin kinasa que se utiliza en el tratamiento del **cáncer de pulmón no microcítico** localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR-TK.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome los comprimidos enteros con agua. **Éstos no se deben masticar ni machacar**. Si tiene problemas para tragarlos, consulte a su farmacéutico del hospital. Puede tomarlos **CON** o **SIN** alimentos, pero evitando siempre el pomelo o zumo de pomelo.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **rash cutáneo**, **diarrea**, **náuseas**, **vómitos**, **pérdida de apetito**, **fatiga**, **disnea** y **alteración hepática** (ojo o piel amarillentos).
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias si presenta **fiebre superior a 38º C**.



## ¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**.
- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos.
- Si es una mujer fértil debe **utilizar medidas anticonceptivas** adecuadas durante el tratamiento con gefitinib.
- Comunique a su médico o farmacéutico si nota algún **signo de sangrado** (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas en la piel).
- Consulte con su oncólogo habitual en la próxima visita toda aquella sintomatología que piense que pueda estar relacionada con su tratamiento oncológico.



## Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- **No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad**.
- **Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)