



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

IMATINIB

(comprimidos de 100 y 400 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

IMATINIB



¿Qué es y para qué se utiliza?

Imatinib es inhibidor tirosin kinasa que se utiliza en las siguientes indicaciones:

- Leucemia mieloide crónica cromosoma Filadelfia+ (Ph+).
- Tumor del estroma gastrointestinal maligno no reseccable o metastásico Kit (CD 117) positivo.
- Leucemia linfoblástica aguda Ph+.
- Algunos Síndromes Mieloproliferativos o hipereosinofílicos.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos **no se deben masticar ni machacar**. Si tiene problemas para tragarlos, consulte a su farmacéutico del hospital.

Debe tomarlos **CON alimentos**, pero siempre evitando el pomelo y el zumo de pomelo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación.

Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, erupciones cutáneas, anemia, dolor de cabeza, retención de líquidos, dolor de las articulaciones, calambres musculares, hipotiroidismo y hepatotoxicidad**.
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús y geles neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias si observa las heces o la orina muy oscuras o con sangre.
- Ante signos de infección (fiebre, tos persistente, dolor y dificultad al orinar), consulte a su médico de atención primaria.



¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya **que imatinib puede interactuar con numerosos medicamentos**.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org