



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TOLVAPTÁN (JINARC®) PARA
POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA
DOMINANTE

15+45mg, 30+60 mg y 30+90 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

TOLVAPTÁN (JINARC®) PARA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tolvaptán pertenece a un grupo de medicamentos denominados antagonistas de la vasopresina. Está indicado para entretener la progresión de quistes y de la insuficiencia renal en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se recomienda tomar tolvaptan dos veces al día: **una dosis mayor por la mañana**, 30 minutos antes del desayuno, y **otra dosis menor por la tarde**, al menos 8 h después de la anterior, **con o sin alimentos**.

Los comprimidos se deben tragar enteros, sin masticar, y acompañados de un vaso de agua.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar **una sola dosis**, debe tomar la dosis tan pronto como lo recuerde en el mismo día. **Si no ha tomado los comprimidos un día**, tome la dosis normal al día siguiente. **NO tome una dosis doble** para compensar las dosis individuales olvidadas.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Que además le servirá de calendario para recordar las tomas. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **sed**, **poliuria** (muchas producciones de orina), **nicturia** (necesidad de orinar por la noche) y **polaquiuria** (aumento del número de micciones), obstrucción urinaria (dificultad para la salida de la orina) o aumento de enzimas hepáticas.

Avisé a su médico si presenta síntomas de alergia (picor, enrojecimiento, hinchazón de lengua).



Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que tolvaptan puede alterar el efecto de otros fármacos.
- Evite el pomelo o zumo de pomelo.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación.
- Debe beber abundante agua u otros líquidos al primer signo de sed. Además, deben beber de 1 a 2 vasos de líquido antes de acostarse, con independencia de la sensación de sed que experimente, y deben volver a beber tras cada micción nocturna.
- Comuníquese a su médico o farmacéutico si es intolerante a la lactosa y/o al almidón de maíz.
- Comuníquese a su médico si está embarazada o en proceso de lactancia.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org