



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINA (JULUCA®)

50/25 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINA (JULUCA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Juluca® es una combinación de dos fármacos antirretrovirales para el VIH (Dolutegravir + Rilpivirina) que está indicado en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Tome Juluca® **CON ALIMENTOS** para alcanzar las concentraciones correctas del principio activo en su cuerpo. Una bebida nutricional no reemplaza a una comida. No masticar ni triturar el comprimido.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela con una comida tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **trastornos del sueño, dolor de cabeza, mareo, náuseas, diarrea, pérdida de apetito, cansancio, erupción cutánea y elevación del colesterol**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

Los comprimidos contienen **lactosa**. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a la lactosa u otros azúcares.

Juluca® **no debe administrarse conjuntamente con algunos medicamentos para tratar las úlceras de estómago/intestino o aliviar el ardor de estómago como son los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, esomeprazol...)**. Sí puede tomarse con otros fármacos como la famotidina si se toma 12 horas antes o 4 horas después de Juluca®, y con antiácidos (p. ej., hidróxido de aluminio o magnesio, carbonato cálcico) si éstos se toman 6 horas antes o 4 horas después de Juluca®.

Los **suplementos de calcio o hierro y preparados multivitamínicos** deben tomarse al mismo tiempo que Juluca® con comida, o claramente separados de Juluca® (al menos 6 horas antes o 4 horas después).

La administración de Juluca® con **dexametasona, rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, fampridina e Hierba de San Juan está contraindicada**.

Si está embarazada, comuníquesele inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas no deben tomar Juluca®, salvo que se lo indique específicamente el médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org