



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LOPINAVER/RITONAVIR (KALETRA®)

200/50 mg comprimidos

100/25 mg comprimidos

80/20 mg por ml de solución oral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

LOPINAVER/RITONAVIR (KALETRA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Lopinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus. Ritonavir se utiliza como potenciador del efecto de lopinavir.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico.

Comprimidos: tómelos enteros, CON o SIN ALIMENTOS. No masticar ni triturar los comprimidos.

Solución: tómela siempre CON ALIMENTOS (estómago lleno).

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

Comprimidos: a temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Solución: en nevera (entre 2°C y 8°C).

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **trastornos gastrointestinales** (diarrea, flatulencia, disminución del apetito), **aumento leve del colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre, mareo, cansancio y dolor de cabeza**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

¡Atención!

La solución contiene **fructosa**. Informe a su médico o farmacéutico si padece una intolerancia a ciertos azúcares.

Las **mujeres en edad fértil** deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org