



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ANAKINRA (KINERET®)

100 mg jeringa precargada



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ANAKINRA (KINERET®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Anakinra es un fármaco inhibidor de la IL-1, una citoquina proinflamatoria implicada en el desarrollo de diferentes enfermedades reumáticas y otras patologías con un componente autoinflamatorio.



¿Cómo se administra?

Se administra por vía subcutánea. Saque la medicación de la nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístresela lo antes posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico o farmacéutico cuándo administrarla.



¿Cómo conservarlo?

En la nevera (NUNCA en el congelador) y en su caja original para protegerlo de la luz. Una vez utilizada, dépositela en el contenedor amarillo que le hemos entregado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer hematoma, calor, dolor, prurito y/o eritema.
- Puede aparecer cefalea y aumento de niveles sanguíneos de colesterol.
- Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- No se debe utilizar anakinra durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva y evitar la lactancia materna.



¡Atención! comuníquese a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Tiene programada alguna operación quirúrgica.
- Tiene alergia al látex.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.



Recuerde...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital utilizando una nevera portátil.
- Si tiene algún problema con la medicación y no puede ponérsela, NO LA TIRE, devuélvanosla a la Farmacia del Hospital y cuéntenos qué problema ha tenido.
- Mantenga este medicamento y el contenedor amarillo fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914269271-914265094 farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org