



Antineoplásicos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

RIBOCICLIB (KISQALI®)

(comprimidos de 200 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# RIBOCICLIB (KISQALI®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Ribociclib es un fármaco que está indicado para el tratamiento del cáncer metastásico de mama en mujeres postmenopausicas.



## ¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse **enteros con o sin alimentos**, a la **misma hora del día** para asegurar una exposición uniforme a Ribociclib. No consumir ningún comprimido que este roto o partido.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis o vomita, tome la siguiente dosis como estaba previsto. **No tome una dosis doble** para compensar los comprimidos olvidados.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **infecciones del tracto urinario, disminución del apetito, fatiga, dolor de cabeza y de espalda, insomnio, edema, dificultad para respirar, estreñimiento, vómitos, diarrea, alopecia.**
- Puede presentar **alteraciones hematológicas** (reducción del número de glóbulos blancos (neutropenia), anemia, y aumento de las transaminasas).
- Otros efectos adversos frecuentes pueden ser: fiebre con reducción de glóbulos blancos (neutropenia febril), disminución del calcio, sodio y fósforo, aumento del lagrimeo, dificultad para hacer la digestión y eritema.



## ¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- No reciba ninguna vacuna sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una **mujer fértil** o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos. Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.



## Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que **Ribociclib puede interactuar con numerosos medicamentos** así como el zumo de pomelo, uva y granada.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)