



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

BRODALUMAB (KYNTHEUM®)

210 mg jeringa precargada



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

BRODALUMAB (KYNTHEUM®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Brodalumab es un fármaco inhibidor de la IL-17 que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades como psoriasis en placas.



¿Cómo se administra?

Se administra por vía **subcutánea**. Saque la medicación de la nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite, y evitar la administración en zonas de la piel que muestren signos de psoriasis.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístresela lo antes posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico o farmacéutico cuándo administrarla.



¿Cómo conservarlo?

En la nevera (NUNCA en el congelador) y en su caja original para protegerlo de la luz. Una vez utilizada, deposítela en el **contenedor amarillo** que le hemos entregado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer **hematoma, calor, dolor, prurito y/o eritema**.
- Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a urgencias si presenta **síntomas de infección** (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- No se debe utilizar brodalumab durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y durante al menos 12 semanas después de la última dosis. Si es madre lactante, valore con su médico el beneficio-riesgo de la lactancia materna antes de utilizar este medicamento.



¡Atención!: comuníquese a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Tiene programada alguna operación quirúrgica.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- Tiene enfermedad de Crohn.
- Tiene antecedentes de depresión.



Recuerde...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital utilizando una nevera portátil.
- Si tiene algún problema con la medicación y no puede ponérsela, **NO LA TIRE**, devuélvanosla a la Farmacia del Hospital y cuéntenos qué problema ha tenido.
- Mantenga este medicamento y el contenedor amarillo fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914269271-914265094 farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org