



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LENVATINIB (LENVIMA®)
(capsulas duras de 4 y 10 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

LENVATINIB (LENVIMA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Lenvatinib está indicado para el tratamiento del **carcinoma diferenciado de tiroides** o **carcinoma hepatocelular** en pacientes adultos.



¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse enteras **con un vaso de agua con o sin alimentos**, siempre en el **mismo horario**. No chupar, ni masticar, ni disolver. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 h espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis. Si vomita, repita la dosis únicamente si ha pasado menos de 30 minutos desde la toma.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 25ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Lenvatinib puede producir: **diarrea/ estreñimiento, náuseas-vómitos, hipertensión**, alteraciones del sueño, dolor de cabeza, mareos, fatiga, **erupciones cutáneas**, alopecia, **sangrado**.

Recomendaciones para el manejo de reacciones adversas:

- **Diarrea y vómitos:** manténgase hidratado, coma y beba con frecuencia cantidades pequeñas.
- **Estreñimiento:** haga ejercicio si es posible, manténgase hidratado, y dieta rica en fibra.
- **Hipertensión:** controle su tensión arterial, desde la primera semana de tratamiento, semanalmente.
- **Reacciones cutáneas:** Utilice jabones neutros y cremas hidratantes. Evite duchas demasiado calientes. Evite la exposición al sol y utilice cremas con factor de protección alta. Beba abundantes líquidos para hidratar la piel. Utilice ropa y calzado cómodo que no ejerza presión y calcetines de algodón.
- Lenvatinib puede **irritar o dañar la boca**. Manténgala limpia para prevenir infecciones.
- Debido al descenso de sus plaquetas, existe un mayor riesgo de aparición de **moratones y sangrado fácil**. Evite el uso de cuchillas, use cepillos de dientes suaves, tenga cuidado con los golpes y al manejar objetos cortantes.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el consentimiento previo de su médico o farmacéutico.



Recuerde...

- Comunique a su **médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales ya que lenvatinib puede **interaccionar con numerosos medicamentos**.
- Consulte con su **médico o farmacéutico** antes de realizarse cualquier intervención quirúrgica, incluso dental, sobre las recomendaciones de manejo de lenvatinib antes y después de la misma.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org