



Antineoplásicos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Trifluridina/tipiracilo (LONSURF®)

(comprimidos recubiertos de 15/6,14 y 20/8,19 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# Trifluridina/tipiracilo (LONSURF®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Trifluridina/tipiracilo (TAS-102) es un fármaco antitumoral análogo del nucleósido timidina (trifluridina) e inhibidor de la timidina fosforilasa (tipiracilo). Está indicado en pacientes con **cáncer colorrectal metastásico**.



## ¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua por la mañana y por la **noche 1 hora después del desayuno y la cena**. Lávese las manos antes y después de cada toma.

DOSIS		DÍAS
Desayuno	Cena	Desde el ___/___/___ hasta el ___/___/___ (___ días)
___ comp. de 15 mg	___ comp. de 15 mg	Desde el ___/___/___ hasta el ___/___/___ (___ días)
___ comp. de 20 mg	___ comp. de 20 mg	



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis para compensar el olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

Se puede conservar a **temperatura ambiente**. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, vómitos, náuseas, fatiga, anemia, síndrome mano-pie, dificultad de cicatrización y mayor susceptibilidad a tener infecciones**.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



## ¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es **intolerante a la lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.



## Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que TAS 102 puede interactuar con algunos medicamentos.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**.
- El Servicio de Farmacia dispensará los comprimidos de trifluridina/tipiracilo. Si le sobra medicación, devuélvala al hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
679050691 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org