



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

OLAPARIB (LYNPARZA®)

(comprimidos de 100 y 150 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

OLAPARIB (LYNPARZA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Olaparib es un inhibidor de PARP que puede utilizarse para el mantenimiento del **cáncer de páncreas y cáncer de ovario** en pacientes que presentan mutaciones en los genes BRCA1/2.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. **Los comprimidos se deben tragar enteros y no deben masticarse, triturarse, disolverse ni dividirse.** Se pueden tomar con independencia de las comidas. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo durante el tratamiento. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar olaparib, debe tomar la siguiente dosis a la hora habitual. En caso de vómito, no repita la dosis y continúe su tratamiento con normalidad. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

Se puede conservar a temperatura ambiente. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, anemia, mayor susceptibilidad a tener infecciones y hematomas o sangrado.**
- Ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado y/o dolor al orinar), consulte a su médico.
- Si tiene fiebre > 38º; presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina, manchas rojizas en la piel); o dificultad para respirar, tos y silbidos al respirar, **acuda a Urgencias.**



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.**
- Las personas en edad fértil, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben evitar manipular este medicamento.



Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales.** Olaparib puede interactuar con numerosas sustancias. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org