



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### LABETALOL

Suspensión 10 mg/ml fr 50 ml



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



# LABETALOL 10 mg/mL suspensión oral



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico le ha prescrito este medicamento para controlar su **tensión arterial**.



## ¿Cómo tomarlo?

Tómelo **con comidas**, siempre del mismo modo y a la misma hora. **Agite** bien la suspensión antes de administrarlo.

Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.



## ¿Cómo conservarlo?

Conservar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco lejos de fuentes de calor.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, cansancio, sudoración y congestión nasal. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.
- Avise a su médico inmediatamente si aparece reacción alérgica, dificultad para respirar, coloración amarillenta de ojos y mucosas.



## ¿Cómo se elabora?

### Composición por 100 ml:

Labetalol (como Trandate® 200 mg comp).....5 ud

Jarabe simple .....c.s.p. 100 ml

Excipientes: este medicamento contiene sacarosa 888 mg/mL, lactosa, amarillo anaranjado y metilparaben



## Recuerde...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar** a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón  
915290405 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)