



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEVOTIROXINA

Suspensión 20 mcg/ml fr 20 ml



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



LEVOTIROXINA 20 mcg/mL suspensión oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico le ha prescrito este medicamento para tratar las enfermedades y disfunciones de la glándula tiroides.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se debe tomar SIN alimentos, por las mañanas. Agitar bien la suspensión antes de administrarlo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

Conservar refrigerado en nevera (entre 2-8°C) y protegido de la luz. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer latidos del corazón irregulares o rápidos, dolor en el pecho, dolor de cabeza, debilidad muscular o calambres, rubor, fiebre, vómitos, alteraciones de la menstruación, temblores, agitación, alteraciones del sueño, sudoración, pérdida de peso y diarrea.
- Es posible que sufra una reacción alérgica a cualquiera de los componentes de la fórmula. Las reacciones alérgicas pueden incluir sarpullido, urticaria e hinchazón de la cara o garganta (angioedema). Si esto ocurre, consulte a su médico inmediatamente.



¿Cómo se elabora?

Composición por 40 ml:

Levotiroxina (como Eutirox® 100 mcg comp) 8 ud

Agua para laboratorio RFE 10 mL

Jarabe simple 30 mL

Excipientes: contiene sacarosa (666 mg/ml), metilparaben, lactosa y almidón de maíz.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando. Si padece alguna enfermedad del corazón (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca...).
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org